

アセモチン液

Rp.	タルク	100g
	酸化亜鉛	100 g
	バレイショデンプン	114 g
	グリセリン	50mL
	蒸留水	800mL
	全量	1 L

処方薬剤規格

局方 タルク (丸石製薬)

局方 酸化亜鉛 (丸石製薬)

局方 バレイショデンプン「ホエイ」(メルク・ホエイ)

局方 グリセリン (シオエ)

調製方法

容器 (ビーカー・メートグラス) に蒸留水を 800mL 入れておき、それにタルク 100g を入れて混ぜる。次に酸化亜鉛 100g を入れて混ぜる。次にバレイショデンプン 114g を入れてよく混ぜる。その後グリセリン 50mL を入れて混ぜて蒸留水をくわえて全量 1L とする。

(注) 今回は全量 1 L で掲載いたしましたが、当然、全量 100mL でも可能です。

出来上がりの製剤に矯臭剤であるベルガモット油 (キシダ化学) (1 L に対し 0.4mL) を加えると、岡山赤十字病院のアセモチンになります。

適応

あせも

耳垢水

R p.	炭酸水素ナトリウム	1.0 g
	グリセリン	5.0m L
	蒸留水	
	全量	20m L

処方薬剤規格

炭酸水素ナトリウム (ヨシダ製薬)

局方 グリセリン (シオエ)

調製方法

炭酸水素ナトリウムを蒸留水に溶かし、この液にグリセリンを加えて製する。

点耳容器に耳垢水を入れる。

適応

耳垢塞栓の軟化